

Příprava pacientů před skiaskopickým vyšetřením

Pokud užíváte léky ráno, vezměte si je i v den vyšetření a zapijte je douškem vody!

Polykací akt a jícen – 2 hodiny před vyš. nejíst, nepít, nekouřit, nežvýkat žvýkačku.

Flebografie – nejméně 4 hodiny lačný.

Pasáž GIT – nejméně 4 hodiny lačný.

Fistulografie – bez přípravy.

Radikulografie a perimyelografie – nejméně 4 hodiny lačný.

Uretrocystografie – těsně před vyšetřením se vymočit.

Cystografie a mikční cystourethrografie – těsně před vyšetřením se vymočit.

Dakryocystografie – nemalovat se.

Irigoskopie

- provedená rektoskopie (nesmí být provedena biopsie!)
- několik dní před vyšetřením vysadit léky (je-li to možné, pacient by se o tom měl poradit se svým ošetřujícím lékařem) a to sedativa, antipsychotika, silná analgetika a spasmolytika

- 2 dny před vyšetřením:

bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu – luštěniny, syrová zelenina, ovoce, čerstvé a celozrnné pečivo, maso, zcela vynechat mléko a všechny mléčné výrobky!), pít hodně tekutin (rostlinné šťávy, džusy, bujóny, polévky, vyhnout se nápojům obsahujícím CO₂)

- pokud nebude použit Fortrans: 100ml 20% MgSO₄ ráno a v poledne

- den před vyšetřením:

- lehká snídaně

- k obědu jen čistá polévka (bujón)

- dále jen tekutiny (na celý zbytek dne asi 2,5 – 3 l, ne mléko!)

- časně odpoledne vypít vyprazdňovací roztok – Fortrans (4 sáčky do 4l tekutin)

- pokud nebude použit Fortrans: 100 ml 20% MgSO₄ ráno a v poledne

- večer před vyšetřením nebo ráno očistné klyzma (nálev 1-2 l vlažné vody do konečníku) s následným řádným vyprázdněním

- ráno v den vyšetření:

- přijít nalačno

Enteroklýza

- několik dní před vyšetřením vysadit léky (je-li to možné, pacient by se o tom měl poradit se svým ošetřujícím lékařem) a to sedativa, antipsychotika, silná analgetika a spasmolytika

- 2 dny před vyšetřením:

bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu – luštěniny, syrová zelenina, ovoce, čerstvé a celozrnné pečivo, maso, zcela vynechat mléko a všechny mléčné výrobky!), pít hodně tekutin (rostlinné šťávy, džusy, bujóny, polévky, vyhnout se nápojům obsahujícím CO₂)

- den před vyšetřením:

- lehká snídaně

- k obědu jen čistá polévka (bujón)

- dále jen tekutiny (na celý zbytek dne asi 2,5 – 3 l, ne mléko!)

- časně odpoledne vypít vyprazdňovací roztok (např. Fortrans)

- ráno v den vyšetření:

- přijít nalačno (od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit)

- těsně před vyšetřením by neměl být prázdný močový měchýř (aby dostatečně vytlačil střevní kličky z malé pánve)

Žaludek a duodenum – od půlnoci před vyšetřením nejíst, nepít, 6 hodin před vyšetřením nekouřit, nežvýkat (jinak se zvyšuje sekrece žaludeční šťávy, která zhoršuje kvalitu vyšetření).

Angiografie – deflatulens (Espumisan) 2 tabl. ráno, v poledne a večer den před vyšetřením, 2 tabl. ráno v den vyšetření, před vyšetřením nejméně 4 hodiny nejezte, čistou vodu můžete pít i krátce před vyšetřením.

IVU

- 2 dny před vyšetřením bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu – luštěniny, syrová zelenina, ovoce, čerstvé a celozrnné pečivo, maso, zcela vynechat mléko a všechny mléčné výrobky!), vyhnout se nápojům obsahujícím CO₂

- deflatulens (Espumisan) 2 tabl. ráno, v poledne a večer den před vyšetřením, 2 tabl. ráno v den vyšetření

- v den vyšetření přijít nalačno (od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit)

- u hospitalizovaných pacientů provést očistný nálev tlustého střeva

- těsně před vyšetřením vymočit

Cholangiografie T drénem - bez přípravy.

PTC a PTD - nejméně 4 hodiny lačný, 2 dny před výkonem -Ampicilin 1g ráno a večer, ex 2.den po výkonu, nebo dle ordinace lékaře.