

Příprava pacientů před ultrazvukovým vyšetřením

Pokud užíváte léky ráno, vezměte si je i v den vyšetření a zapijte je douškem vody!

Sono měkkých tkání, včetně kloubů, krku, nadbránic, varlat, doppler magistrálních tepen mozku, doppler žilního a tepenného systému končetin – bez přípravy.

Sono pankreatu – nejméně 4 hodiny lačný, deflatulens (Espumisan) 2 tabl. ráno, v poledne a večer den před vyšetřením, 2 tabl. ráno v den vyšetření.

Sono hepatobiliárního systému – nejméně 4 lačný.

Sono ledvin a močového měchýře, pánve – dostatečný příjem tekutin a nejméně 2 hodiny před vyšetřením nemočit.

Sono břicha, retroperitonea – dva dny před vyšetřením nenadýmavá strava, deflatulens (Espumisan) 2 tabl. ráno, v poledne a večer den před vyšetřením, 2 tabl. ráno v den vyšetření, od večera před vyšetřením bez tuhé stravy, nejméně 4 hodiny lačný, nejméně 2 hodiny před vyšetřením nemočit.

Sono sleziny – bez přípravy.

Sono doppler renálních tepen, doppler portálního systému, doppler aorty a jejich nepárových viscerálních větví – od večera bez tuhé stravy, nejméně 4 hodiny lačný, deflatulens (Espumisan) 2 tabl. ráno, v poledne a večer den před vyšetřením, 2 tabl. ráno v den vyšetření.