

Příloha k informovanému souhlasu

Vážený pane,

bylo Vám navrženo provedení níže uvedeného zdravotního výkonu. Rádi bychom Vás seznámili se všemi důležitými skutečnostmi, které se výkonu a Vaší osoby týkají.

1. Název výkonu: CIRKUMCIZE (operace předkožky, obřízka)**2. Účel, povaha, předpokládaný prospěch:**

Při vyšetření na urologické ambulanci bylo u Vás diagnostikováno zúžení předkožky, čili fimóza. Jediným řešením Vašeho onemocnění je operace - **cirkumcize**. Naše zdravotnické zařízení Vám nabízí provedení tohoto zákroku. Z lékařského hlediska je Vám doporučeno provedení zákroku, jeho odložení na dlouhou dobu nebo jeho neprovedení Vás ohrožuje zejména:

- bolestivým zaškrcením žaludu s nemožností přetažení předkožky zpět do běžné polohy (tzv. parafimóza),
- vznikem zánětu žaludu pro nedostatečnou hygienu,
- častými infekcemi močových cest,
- bolestivostí a možností krvácení při pohlavním styku,
- vznikem zúženiny močové trubice,
- nádorovým onemocněním penisu.

3. Průběh zdravotního výkonu:

Zákrok se provádí v celkové anestezii (pacient spí), nebo ve spinální anestezii (pacient necítí dolní polovinu těla po injekci do zad k nervům míchy). Podle místního nálezu bude provedena buď plastická úprava předkožky s jejím částečným zachováním či její úplné odstranění (tzv. cirkumcize čili obřízka). Při plastické úpravě se odstraní zúžená část předkožky tak, aby zbývající část kryla částečně žalud a současně aby bylo možné zbylou předkožku zcela volně přetáhnout. Pokud bude krátká uzdička předkožky, bude provedena též její plastická úprava, vedoucí k jejímu prodloužení. Při obřízce se odstraňuje předkožka celá, takže celý žalud je pak obnažen. Používá se vstřebatelný šicí materiál, tudíž není nutné stehy vytahovat, sami odpadnou po zhojení asi po 14 dnech. Celý výkon trvá průměrně asi půl hodiny.

4. Nejčastější rizika a důsledky výkonu:

- krvácení (během operace, po operaci),
- infekce rány.

Tyto komplikace předpokládáme a při provádění tohoto výkonu se chováme tak, aby se vyskytly co nejméně, všechny tyto komplikace se dají řešit.

5. Možná omezení v obvyklém způsobu života, pracovní schopnosti a zdravotní způsobilosti:

Po dobu min. 1 měsíce se nedoporučuje všem pacientům pohlavní styk, jinak hrozí infekce nebo rozestoupení rány s krvácením. Délka pracovní neschopnosti záleží na pracovním zařazení a její maximální délka činí 2 týdny.

6. Údaje o dalším postupu a režimu po provedení výkonu:

Pacient je uložen na standardní lůžko se zavedenou pooperační péčí. Druhý pooperační den je schopen běžných úkonů bez omezení, bude si provádět pravidelnou hygienu rány koupelemi a aplikací antibiotické masti do předkožkového vaku. Pacient je propuštěn do domácí péče 3. - 4. pooperační den.

7. Možné alternativy výkonu v Nemocnici Kyjov:

Žádné nejsou, existují pouze různé modifikace operačního řešení, jejichž podrobnější popis překračuje možnosti této publikace.